

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj /Seri/Parti numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 09.07.2004 – 2013 / 65

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yerleşim Yeri	Uygulama alanı	Uygulama şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fareler	Meskece ve mesken çevresi	İstasyonlar içeriside düşük popülasyonlarda 5 m'de bir, yoğun popülasyonlarda 3 m'de bir uygulanır.	İstasyon başına 20-30 g	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarı karar verilir.
Sıçanlar	Meskece ve mesken çevresi	İstasyonlar içeriside düşük popülasyonlarda 10 m'de bir, yoğun popülasyonlarda 5 m'de bir uygulanır.	İstasyon başına 50 -100 g	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarı karar verilir.

1 pasta yem= 10 gram

Kullanma şekli:

1. Ambalajın açılmasından başlayarak mücadelenin tüm aşamalarında mutlaka ELDIVEN kullanınız. Bu hem sizi koruyacak hem de fare ve sıçanların insan kokasından etkilenerek yem tüketiminden kaçınmasını engelleyecektir.
2. Uygulama, fare zehrini dış etkilerden koruyacak şekilde korunmalı ve sağlamlıkta olan ve diğer sıcakkanlı canlılar tarafından kolaylıkla açılmayacak şekilde kapalı veya ulaşılması zor alanlara yem istasyonu içerisinde yapılmalıdır.
3. Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar, kemirne izi olan yerler ile kemirgen dışkılarının görüldüğü alanlar, asma tavanlar ile insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuytu bölgelerdir.
4. Çatı fışkırımları, binaların üst katları ve tavar arası gibi alanlara yuva yaparak veya binaya bitişik ağaç ve bitkiler ile elektrik veya benzeri kabloların üzerinden geçerek zarar yapmaktadır.
5. Sıçanlar, yuvalarını çoğunlukla karalızasyon sistemlerine veya toprak altına yapılmaktadır. Mesken çevresindeki, özellikle su kaynaklarına yakın toprak alanlar yuvalanma olma ihtimaline karşı incelenmeli ve yuvalanma varsa uygulama yapılmalıdır.
6. Açıkta gıda maddesi bulunmaması, fare ve sıçanların kolayca ulaşabileceği su kaynaklarının ortadan kaldırılması, yuvalanma alanı olabilecek alanların kontrol altına alınması fare ve kemirgen mücadelesinin hızla çözülmesi açısından son derece faydalı olacaktır. Fare ve sıçanlar ortamdaki değişikliklerden tedirgin olduklarından, **Racumin® Paste** uygulamasından hemen önce yapılacak değişiklikler mücadeleyi olumsuz yönde etkileyebilir ve fare ve sıçanların yem tüketmesini geciktirebilir.
7. Racumin Paste antikoagülant özellikte bir zehirli yemdir. Antikoagülant fare zehirlerinin etki mekanizması zehreyle fare tarafından yendikten sonraki 4 ila 10 gün içerisinde ölüm gerçekleşir. Bu nedenle zehirli etki sayesinde, kolonideki diğer fareler ölümün hangi yemden kaynaklandığını tespit edemezler ve Racumin Paste ile beslenmeye devam ederler.
8. 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine yenilerini ekleyiniz.
9. Tüketilmeyen yemlerin bulunduğu istasyonların yerlerini ve bulaşık ve bozulmuş yemleri yenisi ile değiştirin.
10. Fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamayı devam ediniz.

Bayar adına fason üretici firmamızın adı ve adresi;

- 1) KOLLANT S.R.L.
Via C Colombo 7/7A
30030 Vigonovo VE İTALYA
- 2) IndustrialChimica S.R.L.
Via Sorgaglia 25
35020 Arre (PD), İTALYA

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bayar Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:53
34770 Ümraniye İstanbul

ÜRÜN TİPİ 14 RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

RACUMİN PASTE'nin muhafaza ve kullanılması dikkatsizlik ve ihmal sonucu ağızdan alındığı takdirde halsizlik, baş dönmesi, tansiyon değişiklikleri ve iç kanamalar bazen de ağız ve burundan kan gelmesi şeklinde zehirlenme belirtileri görülebilir.

İlk yardım önlemleri

Zehirlenen kişiyi derhal doktora götürünüz.

Antidodu ve gerekli bilgiler

K1 Vitamini

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta 25±2 °C'de muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H360D Doğumun çocuklara hasara yol açabilir.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

K1001 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P308 + P311 Maruz kalıma veya etkileşme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.

P308 + P313 Maruz kalıma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakımı alın.

P405 Kilit altında saklayın.


P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyarı Kelimesi: Tehlike

Bakanlık Onayı:

Uzm.Dr. Hakan
Genel Müdür



30 Nisan 2020

KULLANICI GRUBU

(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Racumin® Paste

Fare ve Sıçanlara Karşı
Antikoagülant özellikli Rodentisit

Formülasyon şekli: Pasta

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)

Coumatetralyl %0.0375 (sal) CAS: 5836-29-3

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Çözücü ve boya maddesi % 1.837, sıvı tat verici madde % 0.001 ve yem maddesi taşıyıcı % 98.124 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.